

## **Przygotowanie do badania RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego**

Jest to badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy, gdzie podaje się doustnie środek cieniujący – siarczan barytu, który posiada właściwości pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Następnie wykonuje się zdjęcia.

Na badanie pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza.

Przygotowanie do badania:

- pacjent zgłasza się na czczo
- pacjent nie pali papierosów i nie żuje gumy
- w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać pokarmów ciężkostrawnych i pić napojów gazowanych
- pacjent zgłasza się na badanie z dokumentacją medyczną i/lub karta informacyjną z wcześniejszego leczenia

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża.

## **Przygotowanie do badania RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego**

Jest to badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy, gdzie podaje się doustnie środek cieniujący – siarczan barytu, który posiada właściwości pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Następnie wykonuje się zdjęcia.

Na badanie pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza.

Przygotowanie do badania:

- pacjent zgłasza się na czczo
- pacjent nie pali papierosów i nie żuje gumy
- w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać pokarmów ciężkostrawnych i pić napojów gazowanych
- pacjent zgłasza się na badanie z dokumentacją medyczną i/lub karta informacyjną z wcześniejszego leczenia

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża.

## **Przygotowanie do badania RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego**

Jest to badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy, gdzie podaje się doustnie środek cieniujący – siarczan barytu, który posiada właściwości pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Następnie wykonuje się zdjęcia.

Na badanie pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza.

Przygotowanie do badania:

- pacjent zgłasza się na czczo
- pacjent nie pali papierosów i nie żuje gumy
- w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać pokarmów ciężkostrawnych i pić napojów gazowanych
- pacjent zgłasza się na badanie z dokumentacją medyczną i/lub karta informacyjną z wcześniejszego leczenia

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża.